

入院のみ 外来のみ ○共通	適応がん種	レジメン名(略語)	臨床使用分類	抗癌剤適応分類	1コース期間
	大腸癌	FOLFIRI	日常診療	術前化学療法	14日間
			臨床試験承認済	術後補助療法	予定総コース PDまで
			治験承認済・審議中	○進行・再発	
その他()					

☆上記のうち該当箇所に○を付けてください

処方No	薬品名(商品名)、溶解液の種類と量	1回投与量	投与時間又は用法	投与日(d1,8など)	投与経路
1	5%ブドウ糖液	250mL	140分	d1	主管
2	Dex グラニセトロン	3A 1mg	15分	d1	点滴(側)
3	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 250mL	2時間	d1	側管
CPT-11と並行					
4	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150mg/m ² 250mL	2時間	d1	側管
ILVと並行					
5	5FU 5%ブドウ糖液	400mg/m ² 50mL	5分	d1	側管
6	5FU 生理食塩液	2400mg/m ² ad. 100mL			
		ad. 230mL	46時間	d1-3	インヒューサーポンプ

留意点および急性期有害事象等	<p><投与基準> WBC>2000/mm³、Neutro>1000/mm³、Hb>7.0g/dl、PLT>50,000/mm³、総ビリルビン<3.6mg/dl、血清クレアチニン2.7mg/dl以下、SpO₂>90%、体温<38℃、BUN<30mg/dL、PS<2</p> <p><有害事象> grade3-4 好中球減少:21.8%、悪心:11.8%、下痢:12.7%</p> <p><減量基準> T-Bil: 基準値上限の1.5~3倍→約60%Dose。中央値2.1(1.0~5.5)→約30%Dose 腎機能低下:原料の必要性なし</p>
----------------	---

参考文献	<p>・Tournigand C et al.FOLFIRI followed by FOLFOX6 or the reverse sequence in advanced colorectal cancer: a randomized GERCOR study.J Clin Oncol. 2004 Jan 15;22(2):229-37. Epub 2003 Dec 2.</p>
------	--

夜間, 帰宅時, 対応医師への連絡先	外来診療中:消化器外科外来(3058) 夜間・休診日:当直医(8219)
--------------------	--------------------------------------