

入院のみ 外来のみ ○共通	適応がん種	レジメン名(略語)	臨床使用分類	抗癌剤適応分類	1コース期間
	大腸癌	mFOLFOX6	日常診療	術前化学療法	14日間
			臨床試験承認済	術後補助療法	予定総コース PDまで
			治験承認済・審議中	○進行・再発	
その他( )					

☆上記のうち該当箇所に○を付けてください

処方No	薬品名(商品名)、溶解液の種類と量	1回投与量	投与時間又は用法	投与日(d1,8など)	投与経路
1	5%ブドウ糖液	250mL	140分	d1	主管
2	Dex	3A			
	ボラミン	1A			
	グラニセトロン	1mg	15分	d1	側管
3	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖液	250mL	2時間	d1	側管
L-OHPと並行					
4	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖液	250mL	2時間	d1	側管
ILVと並行					
5	5FU	400mg/m <sup>2</sup>			
	5%ブドウ糖液	50mL	5分	d1	側管
6	5FU	2400mg/m <sup>2</sup>			
	生理食塩液	ad. 100mL			
		ad. 230mL	46時間	d1-3	インヒューサーポンプ

留意点および急性期有害事象等	<投与基準>
	WBC>2000/mm <sup>3</sup> 、Neutro>1000/mm <sup>3</sup> 、Hb>7.0g/dl、PLT>50,000/mm <sup>3</sup> 、総ビリルビン<3.6mg/dl、血清クレアチニン2.7mg/dl以下、SpO <sub>2</sub> >90%、体温<38℃、BUN<30mg/dL、PS<2
	<有害事象> grade3-4 悪心・嘔吐:9%、末梢神経障害:3%
	<減量基準> 【L-OHP】 Ccr > 20mL/mLでは100%Dose (NCI Organ Dysfunction Working Group)

参考文献	•Cheeseman SL et al. A 'modified de Gramont' regimen of fluorouracil, alone and with oxaliplatin, for advanced colorectal cancer.Br J Cancer. 2002 Aug 12;87(4):393-9.
------	--

夜間, 帰宅時, 対応医師への連絡先	外来診療中:消化器外科外来(3058) 夜間・休診日:当直医(8219)
--------------------	--------------------------------------