

入院のみ 外来のみ ○共通	適応がん種	レジメン名(略語)	臨床使用分類	抗癌剤適応分類	1コース期間
	神経腫瘍	TMZ + IFN-β+BV 維持療法	○日常診療	術前化学療法	28日間
			臨床試験承認済	○術後補助療法	
			治験承認済・審議中	再発転移・進行	予定総コース
		その他()			6コース

☆上記のうち該当箇所○を付けてください

処方No	薬品名(商品名)、溶解液の種類と量	1日投与量	投与時間又は用法	投与日(d1,8など)	投与経路
1	テモダール	150 mg/m2	1×寝る前(空腹時)	d 1 - d 5	内服
				1サイクル目のみ	
				※経口摂取困難症例に関しては点滴静注で投与	
	テモダール	200 mg/m2	1×寝る前(空腹時)	d 1 - d 5	内服
				2クール目以降(認容性が確認された時のみ)	
				※経口摂取困難症例に関しては点滴静注で投与	
2	生理食塩液	200mL	150分	d1.15	末梢静脈(主)
3	フェロン 生理食塩液	300万 IU 100mL	60分	d1.15	末梢静脈(側)
4	アバスタチン 生理食塩水	10mg/kg 100ml	30分 ^{*1)}	d1.15	点滴静注(側)

留意点 および 急性期 有害事象等	<p><併用薬剤・療法> フェロン投与日は点滴開始前にジクロフェナクNa坐薬25or50mgを挿肛またはジクロフェナクNa25mgを内服する。 ・*1:原則、放射線併用期を経たものとする事を前提に30分登録とする。(BV初回投与時間は90分、2回目 60分、3回目以降は30分)</p> <p><投与基準> 1) WBC\geq3000/mm³(好中球\geq1500/mm³)またはPlt\geq10万/mm³ 2) 総ビリルビン\leq1.5 mg/dl, GOT,GPT\leq100IU/L 3) 血清Cr\leq1.5mg/dl 4) うつ病がない 5) 間質性肺炎がない 6) 非血液毒性\leqNCI-CTC grade 2</p> <p><有害事象> 1) 小紫胡湯の併用は禁忌。また相互作用のためワーファリン、テオフィリンとの併用には注意する。(とくにフェロンの場合) 2) うつ病(0.1%未満)、間質性肺炎(0.1%未満)、その他重篤な合併症がみられた場合は直ちに中止する。 3) 造血器障害:リンパ球減少(42%),WBC減少(34%),Plt減少(26%) 4) 肝機能障害: GOT/GPT上昇(26%)\geq100IU/Lで休薬。 5) 出血(19.2%)、高血圧(17.9%)、血栓塞栓症、アナフィラキシーなどに注意する。(とくにアバスタチンの場合)</p> <p><中止基準> 1) WBC<1000/mm³,Plt<75000/mm³ 2) 総ビリルビン\geq1.5 mg/dl GOT,GPT\geq100IU/L 3) 血清Cr\geq1.5mg/dl 4) うつ病、間質性肺炎、その他重篤な合併症がみられた場合。 5) 非血液学的な副作用\geqNCI-CTC grade 3</p> <p><その他> 【TMZ】 中等度催吐性リスク薬剤にて、高度の悪心・嘔吐が出現時は5HT₃拮抗薬またはdexをオプションとする。 【BV】 ・初回は入院導入とする。 ・大手術後28日以内に本剤を投与したデータはないため、十分な間隔をもつこと。 ・投与回数増加に伴い高血圧が発現する傾向がある。降圧薬は高血圧治療ガイドライン等に準じるが、現時点で厳密な優先順位はない</p>

参考文献	<ul style="list-style-type: none"> Chinot OL, de La Motte Rouge T, Moore N, Zeaier A, Das A, Phillips H, Modrusan Z, Cloughesy T. AVAglio: Phase 3 trial of bevacizumab plus temozolomide and radiotherapy in newly diagnosed glioblastoma multiforme. Adv Ther. 2011 Apr;28(4):334-40. Nagane M, Nishikawa R, Narita Y, Kobayashi H, Takano S, Shinoura N, Aoki T, Sugiyama K, Kuratsu J, Muragaki Y, Sawamura Y, Matsutani M. Phase II study of single-agent bevacizumab in Japanese patients with recurrent malignant glioma.
------	--

夜間、帰宅時、対応医師への連絡先	内線 8229
------------------	---------